

[患部]胃

[バイタル] 80(99)

[手術時間] 5:00:00

一 出演節节 一		
The patient's Life is in your hands		
1 腹部を消毒して切開(切開→P24)	•	
 2 腫瘍×3を特定し、すべて切開する(腫瘍	5→P26) (
1 3 腫瘍×3の組織液をまとめて吸引し、3~	つの腫瘍	
を順番に切り離す(腫瘍→P26)		
4 腫瘍×3を取り除き、追加トレイにある人	工膜を切	
除痕に乗せて定着させる(腫瘍→P26)		
5 発生した小腫瘍を焼却し、レーザー痕を け残すように治療(小腫瘍→P27)	₹1ヵ所だ <u>/</u>	
	-レーザー 1	
痕を治療(バイタル回復→P23、小腫瘍	5→P27)	
7 右上に発生した腫瘍×2を特定し、すべて 【 (腫瘍→P26)	切開する	\
	n Till nati	
3 腫瘍の組織液と周囲にある血溜まりを明瘍を切り離す(腫瘍→P26、血溜まり→I		
り 腫瘍を取り除き、追加トレイにある人工	膜を切除	•
痕に乗せて定着させる(腫瘍→P26)		
10 発生した小腫瘍をまとめて焼却し、レー 治療(小腫瘍→P27)	ザー痕を	•
新野を上に移動し、腫瘍を切開(腫瘍-	→P26)	
12 0~00の手順で腫瘍と血溜まりを処置		
(腫瘍→P26、血溜まり→P24)	5	
3 術野を下に移動し、腫瘍×2を切開(腫瘍	寡→P26)	\
14 腫瘍の組織液を吸引しようとすると、ドレ	ノーンが故 🥝	d d
障するイベントが発生		

バイタルを回復(バイタル回復→P23) 胃の右上部に発生した血溜まりと腫瘍×2の組 織液を吸引(血溜まり→P24、腫瘍→P26) 9 0~0の手順で腫瘍と血溜まりを処置 (腫瘍→P26、血溜まり→P24) 8/-)術野を左下に移動 血溜まりをすべて吸引し、バイタルを回復する (血溜まり→P24、バイタル回復→P23) 1 腫瘍×3を特定し、すべて切開する(腫瘍→P26) 😮 🕠 ~ 🕠 の手順で腫瘍、血溜まり、小腫瘍を処置 1 (腫瘍→P26、血溜まり→P24、小腫瘍→P27) 腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25) S 🍆 🗩 The patient is saved



人工膜を乗せるときは血溜ま りに注意。切除痕の周囲に 血溜まりがあると、新たな人 工膜が必要になる。



.

0 .

0

約20秒間ドレーンが使用不 可になる。そのあいだはバイ タルが下がっていくので、しっ かりと回復させておこう。



素早く腫瘍の処置ができるな らバイタル回復を後回しにし 、腫瘍除去中にバイタルの 回復を行なってもいい。

SPECIAL BONUS

(バイタル回復→P23)

15 ドレーンが使用できるまでバイタルを回復

16 ドレーン復活後に心細動が発生し、心停止後に

レ 心臓マッサージを6回行なう(心細動→P31)

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	80	100	110	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	120	180	190	1.2
Cool 判定〇〇回以上取得	5	10	12	1.3

OPERATION RANK

ランク	Easy	Normal	Hard
С	0~4199	0 ~ 6199	0 ~ 7799
В	4200 ~ 4399	6200 ~ 6499	7800 ~ 7999
Α	4400 ~ 4599	6500 ~ 6699	8000 ~ 8299
S	4600 ~	6700 ~	8300 ~ 8499
XS	_	_	8500 ~

EPISODE





[患部]大腸

[バイタル] 80(99)

[手術時間] 5:00:00

腹部を消毒して切開(切開→P24)	*
動脈瘤に鎮静剤(茶色の液体)を投与し、ガイド	
到脈瘤に誤削剤(茶色の液体)を投与し、カイトラインに沿って瘤を切り離す(動脈瘤→P33)	
瘤を取り除き、血溜まりを吸引(動脈瘤→P33)	1
血管を繋げ 接合部分を縫合(動脈瘤→P33)	19
	+
巨大動脈瘤に鎮静剤を投与し、ガイドラインに沿	11
って瘤を切り離す(巨大動脈瘤→P33)	
瘤を取り除き、血溜まりを吸引(動脈瘤→P33)	100
追加トレイの人工血管を血管と血管のあいだに	1
配置(巨大動脈瘤→P33)	
血管の接合部分×3を縫合(巨大動脈瘤→P33)	S
バイタルを回復(バイタル回復→P23)	
動脈瘤×2に鎮静剤を投与(動脈瘤→P33)	-
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
術野を左に移動させて鎮静剤を巨大動脈瘤、動 脈瘤の順に投与し、巨大動脈瘤の瘤を切り離す	0//
脈瘤の順に投与し、巨人動脈瘤の瘤を切り離り (巨大動脈瘤→P33、動脈瘤→P33)	
(L) (MAIN H) (O) (MAIN H) (O)	
○~○の手順で巨大動脈瘤だけを先に処置する	215
(巨大動脈瘤→P33)	
術野を右に戻し、右下にある動脈瘤を②~●の	011
手順で処置する(動脈瘤→P33)	010
術野を左に移動させ、動脈瘤を②~◎の手順で	011
処置する(動脈瘤→P33)	019
術野を右上に移動させ、動脈瘤を②~①の手順	02/5
で処置する(動脈瘤→P33)	1000
巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2回ずつ投与し、続け	1
て左下 右上の動脈瘤の順に鎮静剤を投与	

CDECIAL

薬の効果が切れた巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2
回ずつ投与(巨大動脈瘤→P33)

8 左下の動脈瘤を2~○の手順で素早く処置し、 薬の効果が切れた巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2 回ずつ投与(動脈瘤→P33、巨大動脈瘤→P33)

】右上の動脈瘤を②~○の手順で素早く処置し、 薬の効果が切れた巨大動脈瘤×2に鎮静剤を2 回ずつ投与(動脈瘤→P33、巨大動脈瘤→P33)

20 巨大動脈瘤(あとに鎮痛剤を投与した側)の瘤を ガイドラインに沿って切り離し、〇~〇の手順で 処置する(巨大動脈瘤→P33)

最後に残った巨大動脈瘤を〇~〇の手順で処 置する(巨大動脈瘤→P33)

腹部の閉創処置を行なう(閉創→P25)

The patient is saved



巨大動脈瘤には2回鎮静剤 を打つ必要がある。ただし2 回目は微量でいいので、余っ た分は動脈瘤に投与しよう。



この動脈瘤を処置中に別の 動脈瘤が発生する。発生位 置のことを考え、動脈瘤が左 上になる位置で処置しよう。



安全に進めるなら、瘤を取り 除くまえにバイタルを回復。 準備ができたら処置を続け、 次の動脈瘤発生に備える。

BONUS	OPERATION	RANK

SPECIAL BONOS					OPERATION HANK			
SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率	ランク	Easy	Normal	Hard
Miss 判定無し				1.3	C	0 ~ 5799	0 ~ 6799	0~7999
○○秒以上残して手術終了 ※	110	140	130	1.2	В	5800 ~ 5899	6800 ~ 7099	8000 ~ 8199
MAX CHAIN 〇〇〇以上	45	50	60	1.2	Α	5900 ~ 6049	7100 ~ 7299	8200 ~ 8499
動脈瘤を破裂させない		—	W	1.3	S	6050 ~	7300 ~	8500 ~ 8699
※分表示ではそれぞれ、Easy1:50 Normal2:	20 Hard2:10				XS		_	8700 ~